DLP-6-11-91001168

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES ®

GRANDES CULTURES

RÉGION CHAMPAGNE-ARDENNE

Bulletin n° 158 du 05/11/91

COLZA	**Ch. Bourgeon terminal**	**Pas d'activité**
	Maladies	**Situation**
ESCOURGEON	**Pucerons**	**Activité en forte baisse**
	Maladies	**Situation**
BLE	**Cicadelles**	**Risque faible**
	Autres insectes	**Situation**

COLZA

Stade B4 à B10.

Charançon du bourgeon terminal

◇ **Situation**

La capture en cuvette jaune de ce ravageur n'est pas aisée. A part la Haute-Marne et très localement l'Aube, les autres régions ont très peu ou pas capturé cet insecte. Il est donc difficile dans les Ardennes et la Marne de dire s'il est absent ou non (conditions climatiques défavorables à sa capture).

Il faut également tenir compte des levées très tardives et du retard de végétation important dans ces secteurs.

Les températures basses et les journées brumeuses ou pluvieuses ne sont pas favorables à son activité.

◇ **Préconisation**

Continuer à surveiller les cuvettes jaunes. Le risque devient nettement plus faible.

Maladies

◇ **Situation**

Le ***mildiou*** est encore bien présent, en particulier sur les parcelles levées tardivement. Le ***phoma*** est observé sur les feuilles de la base sans évolution majeure.

◇ **Préconisation**

Aucune intervention.

ESCOURGEON


Stade 1 à 4 feuilles.

Pucerons

◇ **Situation**

Pas de vol à la tour de ***R. padi*** depuis une quinzaine de jours.

VOL DE R. padi A LA TOUR




L'activité en culture est également très faible. Les observations réalisées les 28 et 29 octobre ont permis de déceler entre 2 et 8 % de pieds avec pucerons (moyenne des comptages réalisés sur 3 départements, sauf les Ardennes).

◇ **Pouvoir virulifère**

Les tests Elisa effectués sur plantules d'orge semées en pots précocement et exposés pendant une semaine aux pucerons permettent de mesurer indirectement le pouvoir virulifère des pucerons. Voici les derniers résultats :

Imprimerie du S.R.P.V. Champagne-Ardenne - Le Directeur-Gérant : J. BOUCHET - CPPAP n° 529 AD (C SPV 1989)



Publication périodique ABONNEMENT ANNUEL : **240 F**

Ministère de l'Agriculture
Service Régional de la Protection des Végétaux
62, avenue Nationale - La Neuvillette
B.P. 1154 - 51056 REIMS CEDEX
Téléphone : 26.09.06.43
Fax : 26.87.39.33



Semaine d'exposition	% pots infectés par le virus 1991	1990
02 au 09/09	-	*0%*
09 au 16/09	**25 %**	*2.5 %*
16 au 23/09	**13 %**	*16.2 %*
23 au 30/09	**5 %**	*16.2 %*
30 au 07/10	**35 %**	*3.7 %*
07 au 14/10	**8 %**	*81.3 %*
14 au 21/10	**11 %**	*56.2 %*
21 au 28/10	**10 %**	*12.5 %*

Le pouvoir virulifère des pucerons et le risque J.N.O. restent faibles.

◇ Préconisation

Une intervention n'est plus justifiée à présent compte-tenu de la très faible activité des pucerons.

Maladies

◇ Situation

De nombreux symptômes ***d'helminthosporiose*** sont visibles sur les premières feuilles.

◇ Préconisation

Pas de traitement justifié.

BLE

Cicadelles

◇ Situation

Les conditions météorologiques sont très peu favorables à l'activité des ***cicadelles*** ce qui explique la forte diminution des piégeages en cuvette jaune (de 0 à 11 dans le réseau Aube-Haute-Marne). De plus, le ***Psamotettix alienus*** est très souvent parasité par un diptère.

Les tests Elisa réalisés sur des individus vivants capturés dans la région Centre montrent un faible pourcentage d'individus virulifères.

◇ Préconisation

Aucune nouvelle intervention insecticide justifiée. Seul le retour de températures plus douces et d'un ensoleillement suffisant pourra permettre la reprise d'activité des cicadelles. Nous vous signalons que le Fastac et le Sumi-alpha ont reçu une autorisation provisoire de vente sur ces ravageurs.

Mouche jaune

◇ Situation

Les captures en cuvette jaune se poursuivent dans les sites où un suivi cicadelles est effectué.

Résultats des comptages de la semaine du 24 au 29 octobre :

LIEU	Nombre total
51	
Mourmelon	**32**
Valmy	**3**
Moslins	**32**
Esternay	**1**
08	
Rethel	**22**
Doux	**44**

◇ Préconisation

Aucune intervention nécessaire.

Oscinies

Sur quelques semis précoces (variété Thésée et Forby), on constate les premiers dégâts de larves ***d'oscinies*** : F1 (1ère feuille) jaune et détruite. Ces attaques peuvent atteindre dans l'Aube jusqu'à 30 % de pieds.

◇ Préconisation

Aucune intervention possible.